

گزارش کوتاه علمی

معرفی یک گونه جدید *Populus x euramericana* روی *Melampsora* در ایران NEW RECORD OF THE GENUS *Melampsora* ON *Populus x euramericana* FROM IRAN

مهرداد عباسی^۱, علی برهانی^۲ و جمشید بوخاری^۳

۱. مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور
۲. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
۳. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

چکیده

اخیراً نمونه‌ای آلوده به زنگ روی *Populus x euramericana* جمع‌آوری شده از مازندران بررسی گردید که ویژگی‌هایی متفاوت از گونه‌های قبل از گزارش شده در کشور داشت. این نمونه دارای مراحل اوردینیوم و تلیوم بود. اوردینیوم‌ها که به دلیل جمع‌آوری آخر فصل غالباً توسط گونه‌ای هیفو میست هیبری‌پارازیت آلوده شده بودند به شکل سورهای کوچک، گرد و پراکنده با ظاهری پودری در سطح زیرین برگ‌های آلوده تشکیل شده بودند. اوردینیوسپورها غالباً واژتخم مرغی کثیفه با دیواره خاردار و بینگ بودند. دیواره اوردینیوسپورها در راس صاف و $1/5-2$ میکرومتر ضخامت داشت. ضخامت دیواره این اسپورها در استوای اسپور تا 6 میکرومتر هم می‌رسید. ابعاد اوردینیوسپورها $15-20 \times 31-43$ میکرومتر اندازه گیری شد. اوردینیوم‌ها حاوی پارافیزهای گرزی با ضخامت انتهایی تا 13 میکرومتر در راس بودند. تلیوم‌های سیاه رنگ در هر دو سطح برگ به صورت زیر اپیدرمی دیده شدند. هر چند این سورها غالباً سطح فوقانی برگ آلوده کرده بودند. تلیوسپورها به شکل غالباً استوانه‌ای با دیواره قهوه‌ای روشن به ضخامت 1 میکرومتر در طرفین و تا $2/5$ میکرومتر در راس اسپور دیده شدند. ابعاد تلیوسپورها $40-64 \times 8-12$ میکرومتر اندازه گیری شد. بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط گوینه (*Melampsora larici-* Gaeumann 1959. Die Rostpilze Mitteleuropas, Buchler, Bern) نمونه فوق کاملاً متنطبق با گونه *populina* Kleb. است. از ویژگی‌های بارز این گونه وجود اندکی ضخامت انتهایی در راس تلیوسپورها، ضخامت انتهایی در راس دیواره پارافیزها، ضخامت دیواره اوردینیوسپورها در استوای اسپور و صافی دیواره در راس اوردینیوسپورها است. مجموع این ویژگی‌ها این گونه را از سایر گونه‌های *Melampsora* روی صنوبر جدا می‌کند. بر اساس نظر کوپرویچ و اولیانیشچف (Kuprevich & Ulyanishchev 1975. Keys to the rust fungi of USSR) این گونه دارای دامنه پراکنش وسیعی است و در اروپا، آسیا، بخش‌هایی از آفریقا و آمریکای جنوبی دیده شده است. بر اساس بازبینه زنگ‌های کشور (عباسی و علی‌ابادی ۲۰۱۰)، بانک اطلاعات الکترونیکی زنگ‌های ایران، تاکنون تعداد ۴ گونه از جنس *Melampsora* روی گونه‌های *Populus* در ایران گزارش شده‌اند. ضمن این که این اولین گزارش زنگ روی گونه *P. x euramericana* در ایران است، گونه زنگ *M. larici-populina* نیز برای میکروبیوتای ایران جدید است. علاوه بر *Aigeiros* هم به عنوان میزان زنگ فوق معرفی شده‌اند (Kuprevich & Ulyanishchev 1975). غالب گونه‌های بخش *P. x euramericana* نمونه بررسی شده: روی *Populus x euramericana* مازندران، ایستگاه چمستان نور، ۱۳۸۹/۹/۶، جمع‌آوری کننده: علی برهانی، .(IRAN 15009 F). II+III